

人体の構造と機能及び疾病

問題 1 以下は、乳幼児期にみられる標準的な発達の特徴を示したものである。2歳前後で始まるものはどれか。**最も適切なものを1つ**選びなさい。

- 1 あやすと笑うようになる。
- 2 「ア－ア－」などの意味のない発声を始める。
- 3 意味のある単語を言い始める。
- 4 集団遊びの決まりごとを守れるようになる。
- 5 2語文を言い始める。

問題 2 人体の部位と疾病、病態との関連性に関する次の記述のうち、**正しいもの**を1つ選びなさい。

- 1 吐血とは、気道から口腔を経て血液を排出することである。
- 2 上腕骨骨折は、寝たきりを引き起こしやすい。
- 3 対麻痺とは、左右どちらか半身に起こる麻痺である。
- 4 踵^{しょうこつぶ}骨部の褥瘡は、仰臥位で起こる。
- 5 声帯の障害は、誤飲を引き起こす。

問題 3 国際生活機能分類(I C F)に関する次の記述のうち、**正しいものを1つ**選びなさい。

- 1 対象は、障害のある人に限られる。
- 2 障害を、社会環境から切り離して捉えている。
- 3 健康状況とは、課題や行為の個人による遂行のことである。
- 4 障害を機能障害、能力障害、社会的不利に分類したものである。
- 5 世界保健機関(W H O)により採択され、国際的に用いられている。

問題 4 日本における健康施策に関する次の記述のうち、**正しいものを1つ**選びなさい。

- 1 「健康日本21」(第二次)には、アルコール摂取に関する項目は含まれていない。
- 2 8020運動は、乳幼児を対象としない。
- 3 歯周疾患検診は、健康増進法に基づき実施されている。
- 4 特定健康診査には、血圧測定は含まれていない。
- 5 特定保健指導の目的は、健康診査の受診勧奨である。

問題 5 高齢者にみられる病態の特徴に関する次の記述のうち、**正しいものを1つ**選びなさい。

- 1 皮膚の湿潤は、褥瘡の発症リスクとなる。
- 2 フレイル(虚弱)は、慢性疾患の終末期の状態である。
- 3 感音難聴では、低い音から聞こえにくくなる。
- 4 変形性膝関節症は、廃用症候群に属する。
- 5 記憶障害では、短期記憶よりも長期記憶が低下する。

問題 6 食中毒に関する次の記述のうち、**正しいものを1つ**選びなさい。

- 1 ノロウイルスに汚染された衣類の消毒には、アルコール消毒が有効である。
- 2 腸管出血性大腸菌O-157の感染予防には、食品の加熱処理が有効である。
- 3 黄色ブドウ球菌は、ベロ毒素を産生する。
- 4 食中毒の原因には、化学物質は含まれない。
- 5 アニサキス症は、冷凍処理では予防できない。

問題 7 精神疾患の診断・統計マニュアル(D S M - 5)の「躁病エピソード」に記載されている症状はどれか。**正しいものを1つ**選びなさい。

- 1 易怒的
- 2 睡眠過多
- 3 幻覚
- 4 疲労感
- 5 強迫行為